

Tabac, alcool, psychotropes : consommations des consultants examinés dans les centres d'examens de santé en 2005 (1/5)

Le Centre Technique d'Appui et de Formation des Centres d'examens de santé (Cetaf) est la source des données régionalisées de l'Assurance Maladie sur l'usage de tabac, d'alcool, de médicaments psychotropes, recueillies auprès des personnes examinées dans les Centres d'Examens de Santé (CES).

Pour plus d'information, voir la publication :

DAUPHINOT Virginie, DUPRE Caroline, GUEGUEN René, NAUDIN Florence, Réseau des Centres d'examens de santé. Géographie de la santé dans les Centres d'examens de santé. Données régionalisées 2005, Saint-Etienne : Centre Technique d'Appui et de Formation des centres d'examens de santé, juin 2008, 88 pages.

Le lecteur y trouvera la description des données recueillies dans les CES, la méthodologie statistique, les indicateurs de santé régionaux dont ceux relatifs à la consommation de produits psycho-actifs.

Cette publication est disponible à la demande au Cetaf : Centre Technique d'Appui et de Formation des centres d'examen de santé, 67-69 avenue de Rochetaillée BP 167 - 42012 Saint-Etienne cedex 02.

Population étudiée

En 2005, les CES ont réalisé 569 415 examens de santé au profit de personnes relevant du régime général de l'Assurance maladie dans les 22 régions de France et dans un département d'outre-mer, la Guadeloupe. A des fins statistiques, certaines régions ont été réunies pour des raisons d'effectifs de population : Basse et Haute-Normandie, Auvergne et Limousin, Corse et Provence Alpes Côte d'Azur (PACA).

En Bretagne, le nombre d'examens de santé réalisés en 2005 sur des personnes de plus de 16 ans s'élève à 26 822. Leur répartition selon le sexe et selon cinq tranches d'âge est précisée dans le tableau ci-dessous.

Nombre d'examens de santé réalisés en Bretagne en 2005

	16-24 ans	25-49 ans	50-64 ans	65-74 ans	75 ans et +	TOTAL
Hommes	1 702	5 595	4 097	1 419	196	13 009
Femmes	2 337	5 442	4 352	1 470	212	13 813
Ensemble	4 039	11 037	8 449	2 889	408	26 822

Source : CETAF, géographie de la santé, données 2005

Méthodologie et présentation des résultats

Le traitement des données des CES, de l'année 2005, comporte des différences par rapport aux données des années précédentes, dont :

- une pondération établie, d'une part, au niveau de chaque région pour estimer les prévalences régionales et, d'autre part, au niveau national pour agréger les résultats « *France entière* » (pondération basée sur le sexe, l'âge, la PCS, le statut vis-à-vis du chômage et de la CMU). L'objectif est de corriger les différences structurelles existant entre la population examinée dans les CES et la population française (autrement dit, de présenter des taux comparatifs).
- les résultats régionaux sont présentés par sexe et selon cinq classes d'âge au lieu de trois précédemment.
- un nouvel indicateur alcool, définissant une consommation à risque.

Dans la présentation qui suit, la Bretagne est comparée à la France et aux autres régions métropolitaines (19 entités géographiques du fait de regroupements).

Tabac

Définition de l'indicateur

L'usage de tabac par le patient est recueilli par auto-questionnaire. Le fumeur est une personne déclarant fumer actuellement au moins une cigarette par jour en moyenne (ou qui a arrêté de fumer depuis moins d'un an).

Tendances générales en France

Le tabagisme augmente entre 16 et 20 ans, pour atteindre son maximum vers 20-24 ans. A partir de 25 ans, il diminue régulièrement.

La proportion de fumeurs chez les hommes dépasse celle des femmes. Au-delà de 65 ans, le pourcentage de fumeurs est au moins deux fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes (il est de 4% chez les femmes de 65-74 ans, et de 9% chez les hommes de cette tranche d'âge).

Tendances en Bretagne



Comparée à la moyenne française, la proportion de fumeurs en Bretagne, diffère nettement selon le groupe d'âge :

- avant 50 ans : la proportion de fumeurs est supérieure en Bretagne,
- au-delà de 50 ans : la proportion de fumeurs est plus faible en Bretagne.

Comparée aux autres régions de France, la Bretagne affiche des extrêmes concernant la répartition des fumeurs selon la tranche d'âge :

- chez les 16-24 ans, la Bretagne présente la proportion la plus élevée de fumeurs chez les filles (54%) et se situe au 4^{ème} rang chez les garçons avec 58% de jeunes fumeurs (derrière Franche Comté : 66%, Auvergne-Limousin : 60% et Midi-Pyrénées : 59%) ;
- à partir de la tranche d'âge 50-64 ans, la Bretagne se situe parmi les régions aux proportions les moins élevées de fumeurs (proportion la plus faible chez les hommes de 50 à 74 ans, et chez les femmes à partir de 65 ans).

Tabac : taux comparatifs de fumeurs (en %), selon la tranche d'âge, en 2005



Source : Cetaf, Géographie de la santé – données 2005

Alcool

Définition de l'indicateur

L'usage d'alcool par le patient est recueilli par auto-questionnaire. Le seuil de risque retenu est une consommation hebdomadaire totale d'au moins 14 verres pour une femme, de 21 verres pour un homme, **soit une consommation moyenne d'au moins 2 verres par jour pour une femme, de 3 verres par jour pour un homme**. Les personnes qui dépassent ces limites sont qualifiées de consommateurs à risque.

Tendances générales en France

La proportion de consommateurs à risque est deux fois plus élevée chez les hommes que chez les femmes, excepté dans la tranche d'âge 16-24 ans où l'écart est plus faible.

La plus forte proportion de consommateurs à risque est enregistrée de 50 à 74 ans (autour de 20% chez les hommes et de 10% chez les femmes).

Tendances en Bretagne

- **Comparaison à la moyenne française**



Chez les hommes, en Bretagne, les proportions de consommateurs à risque sont toujours supérieures à celles de la moyenne française. L'écart le plus important est observé dans la tranche d'âge 16-24 ans : 18% de consommateurs à risque en Bretagne, c'est-à-dire le double du taux moyen : 9%.

Chez les femmes, le maximum est atteint dans la tranche d'âge 16-24 ans avec 13% de consommatrices à risque, contre 5% en moyenne française. Les autres tranches d'âge se situent au-dessous de 11% et affichent des proportions proches de la moyenne française.

- **Comparaison aux autres régions de France**

La Bretagne présente la proportion la plus élevée de consommateurs à risque chez les 16-24 ans, garçons et filles. Dans les autres tranches d'âge, seule la région Languedoc Roussillon présente des proportions plus élevées, chez les hommes et les femmes, sauf chez les femmes de 75 ans et plus (région Nord-Pas-de-Calais).

Alcool : taux comparatifs de consommateurs à risque (en %), selon la tranche d'âge en 2005



Source : Cetaf, Géographie de la santé – données 2005

Médicaments psychotropes

Définition de l'indicateur

La consommation de médicaments est recueillie et codifiée par le médecin qui effectue l'examen clinique du patient. Les médicaments psychotropes figurent parmi les plus consommés avec les médicaments à visée cardiovasculaire. La classe des psychotropes inclut les hypnotiques, les anxiolytiques, les neuroleptiques et les antidépresseurs.

Tendances générales en France

La proportion de consommateurs de psychotropes est plus élevée chez les femmes. Elle augmente avec l'âge : entre les plus jeunes (16-24 ans) et les plus âgés (75 ans et plus), le taux moyen passe de 2% à 12% chez les hommes, et de 3% à 23% chez les femmes.

Dans les tranches d'âge allant de 16 à 64 ans, la proportion de consommateurs de psychotropes la plus élevée est observée en Auvergne – Limousin.

Tendances en Bretagne

- **Comparaison à la moyenne française**



En Bretagne, en dehors de la tranche d'âge 16-24 ans, le taux de consommateurs de psychotropes est plus élevé qu'en moyenne française.

- **Comparaison aux autres régions de France**

Après 25 ans, la Bretagne se situe parmi les régions aux taux les plus élevés avec les régions Aquitaine, Poitou-Charentes, Centre, chez les hommes. Elle passe derrière les régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Pays de la Loire, chez les femmes.

Les taux bretons sont proches des taux les plus élevés, chez les hommes comme chez les femmes.

Médicaments psychotropes : taux comparatifs de consommateurs (en %), selon la tranche d'âge en 2005



Source : Cetaf, Géographie de la santé – données 2005

Conclusion

Comparaison à la moyenne française

La Bretagne présente des taux comparatifs de consommateurs de produits psycho-actifs plus élevés :

- avant 50 ans pour **les fumeurs** (chez les hommes comme chez les femmes),
- chez les femmes de 16-24 ans et de 50-64 ans, et chez les hommes dans toutes les tranches d'âge, pour **la consommation d'alcool à risque**,
- dans les tranches d'âge au-delà de 25 ans pour **les médicaments psychotropes** chez les hommes et les femmes.

La Bretagne présente des taux moins élevés qu'en moyenne française pour :

- **les fumeurs** à partir de 50 ans, chez les femmes et chez les hommes excepté ceux de 75 ans et plus,
- **la consommation d'alcool à risque** chez les femmes de 75 ans et plus.

La Bretagne est au niveau de la moyenne française pour :

- **les fumeurs** chez les hommes de 75 ans et plus,
- **la consommation d'alcool à risque** chez les femmes de 25-49 ans et de 65-74 ans,
- **les médicaments psychotropes** chez les 16-24 ans (hommes et femmes), et chez les femmes de 75 ans et plus.

Comparaison aux autres régions de France

En Bretagne, les plus jeunes (tranche d'âge 16-24 ans), présentent les taux régionaux les plus élevés de consommateurs d'alcool à risque (chez les hommes et les femmes), et de fumeurs chez les femmes (les hommes de 16-24 ans figurent cependant parmi les 4 régions aux taux de fumeurs les plus élevés).

Après 25 ans, la Bretagne se situe parmi les régions aux taux les plus élevés pour :

- **la consommation de médicaments psychotropes** (sauf chez les femmes de 75 ans et plus),
- **la consommation d'alcool à risque** chez les hommes.

La Bretagne se situe parmi les régions aux taux les moins élevés, à partir de la tranche d'âge 50-64 ans, concernant les fumeurs (hommes et femmes).