

Quelques repères épidémiologiques

Gwénaëlle Boscher



9 pl. du Général Koenig, 35000 Rennes

02.23.20.14.60

cirdd@cirdd-bretagne.fr


Les consommations d'alcool chez les femmes en âge de procréer -1-

L'alcool est la substance psycho-active la plus consommée dans la population Française, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge

Chez les femmes en âge de procréer


✓ Environ 57% de consommatrices occasionnelles (une fois par mois ou plus rarement)

✓ Moins de 1% de consommatrices quotidiennes déclarées au cours des 12 derniers mois



Les consommations d'alcool chez les femmes en âge de procréer -2-

Les pratiques d'ivresse
au cours des 12 derniers mois



La grossesse une période de changement de comportement vis-à-vis de l'alcool ?



- Etude française réalisée par Chazeron et al. (2008)
- Auprès de 837 femmes qui viennent d'accoucher
 - 21.7% indiquent n'avoir pas du tout consommé d'alcool et ont un score au test AUDIT de 0.

La grossesse une période de changement de comportement vis-à-vis de l'alcool ?



Parmi les consommatrices d'alcool 52.2% des femmes indiquent avoir consommé de l'alcool au moins une fois au cours de leur grossesse et ont un score au test AUDIT > 1 (N=437)

Nombre de verres standard bus par occasion de consommation	Fréquence de consommation par occasion (%)			
	≤ 1 fois par mois	2 à 4 fois par mois	2 à 3 fois par semaine	≥ 4 fois par semaine
1 ou 2	69.1	20.4	4.1	0.7
3 ou 4	1.8	3.2	0.5	0
5 ou 6	0.2	0	0	0

- 28.9% peuvent être considéré comme à fort risque de SAF
- Parmi les femmes qui ont déclaré avoir consommé de l'alcool : 2 ont eu un enfant SAF (1.8/1000).


Les consommations de tabac chez les femmes en âge de procréer -1-

Statut tabagique actuel des femmes selon l'âge (en %)




Les consommations de tabac chez les femmes en âge de procréer -2-

Présence de signes de dépendances chez les fumeurs réguliers selon le sexe et l'âge (en %)



Les consommations de tabac chez les femmes en âge de procréer -3-

Consommation quotidienne des fumeurs actuels, selon le sexe et l'âge (en Nbre de cigarettes)




Evolution du tabagisme chez les femmes pendant la grossesse

- En 2004, Delcroix faisait état de la prévalence du tabac au cours de la grossesse entre 1972 et 2000

	1972	1981	1995	2000
AVANT LA GROSSESSE	17%	27%	39%	48%
PENDANT LA GROSSESSE	10%	15%	25%	28%

- Sur la période 1972-2000 : plus de femmes fumeuses, y compris pendant la grossesse
- Environ 1/2 arrête de fumer au cours de la grossesse
- En 2008, selon Chazeron et al. et l'ORS Haute Normandie : de moins en moins de femmes fumeuses


Les consommations de cannabis chez les femmes en âge de procréer




- Le cannabis est généralement consommé par les jeunes générations, notamment chez les femmes, où les usages au cours de l'année deviennent assez négligeables vers 50 ans (<1%) de consommatrices.

Les consommations de cocaïne chez les femmes en âge de procréer

- Des usages de cocaïne très faibles chez les femmes



Les consommations d'ecstasy chez les femmes en âge de procréer



- Des niveaux d'usage d'ecstasy qui culminent vers 25-29 ans chez les femmes comme chez les hommes
- Un usage au cours de l'année faible chez les femmes

Consommation de drogues pendant la grossesse -1-



- Aux Etats Unis, près de 5,5% des nouveau-nés naissent de mères ayant consommé des drogues illégales au cours de leur grossesse (NIDA, 1992).
- En France, aucune étude aussi précise. Toutefois, l'équipe de Cochin port Royal en 2000 indiquait qu'il y aurait par an en France entre 500 et 2500 grossesses menées à terme par des mères toxicomanes.

Consommation de drogues pendant la grossesse -2-

- Etude menée par Casen et al. (2001) auprès de 171 mères toxicomanes montrent que 72% d'entre elles ont essayé d'arrêter de consommer au moins un des produits pendant leur grossesse
 - 39% l'héroïne
 - 34% le tabac
 - 7% le Subutex®
 - 6% la cocaïne
 - 4% le cannabis

Consommation de drogues pendant la grossesse -3-



- La plupart du temps, les tentatives étaient à l'initiative de la mère, sans aide externe (63%)
- 13% avec l'aide de produits de substitution
- 12% en milieu institutionnel

Consommation de drogues pendant la grossesse -4-





- 50% des femmes ont pu parler de leur problème de toxicomanie à la personne qui suivait leur grossesse
- 50% n'ont pu en parler
 - secret personnel (46%)
 - Honte et culpabilité (31%)
 - Peur du jugement de l'autre (10%)
 - Peur du retrait de l'enfant (10%)




Je vous remercie
pour votre attention

Les consommations d'alcool chez les femmes en âge de procréer -3-

Proportion de consommateurs d'au moins 6 verres d'affilée au cours des douze derniers mois suivant l'âge et le sexe



L'environnement des enfants en bas âge



- La présence d'enfant(s) en bas âge au sein d'une famille, ne les protège pas forcément du tabagisme passif
- 26-45 ans : âge de la prévalence du tabagisme (Homme/Femme)
- 70,5% des foyers où il y a un enfant de moins de 1 an sont intégralement non fumeurs
- Dans 15,2% des foyers où il y a un enfant de moins de 1 an quelqu'un fume régulièrement
- Plus l'enfant est âgé, plus la proportion de foyers « non fumeurs » tend à reculer
 - 53% de foyer fumeur (enfant de 4 ans)
 - 58% de foyer fumeur (enfant de 12 ans)
- Cependant, il peut y avoir existence de zone non fumeur dans le foyer, ou absence de consommation de tabac en présence d'un enfant